Prise en charge chirurgicale de la pathologie dégénérative du genou

Pôle ostéoarticulaire sport et santé
Mêdipole de santé
Bourgoin Jallieu

Dr Roger BADET

Les Docteurs

- Badet : *Chirurgiens orthopédistes*
- Cédoz, Vincent, Paulin et Perrier :
médecins rhumatologues
- Quélard : *médecin rééducateur*
- Fabre : *médecin interniste infectiologue*

Ont le plaisir de vous convier à
une réunion conviviale sur le
thème :

**PRISE EN CHARGE DE LA
MALADIE ARTHROSIQUE**

Jeudi 31 Janvier 2013 à 20h

Pôle Ostéoarticulaire Santé et Sport 1er salle
conférence Cabinet du Dr Badet

Bilan RADIOLOGIQUE systématique

Moins de 50 ans : Face + Profil + Vue axiale à 30°

Plus de 50 ans : clichés en shuss en plus +++

pincement postérieur ++

Recherche d'une PATHOLOGIE CARTILLAGINEUSE +++

Quelque soit l'âge douleur articulaire mécanique
aggravée par l'effort

- Douleur
- Gonflement
- Blocages
- +/- craquements

RX simples systématiques ++
Schuss après 50 ans +++
Arthroscanner ++++

0

normal ou presque

1

< 50%

2

> 50% < 100%

3

Pincement complet sans perte osseuse

4

perte osseuse ou subluxation

IRM

Protocole ICRS (*MOSCART*)

2 D ou 3D FSE T2 FS

3D GRE T1FS

Taille, profondeur, os, vitalité du fragment (OCD)

Patient jeune < 55-60 ans ou stade modéré de lésion cartilagineuses :
Traitement rhumatologique +/-
traitement chirurgical conservateur

0

normal ou presque

1

< 50%

2

> 50% <100%

Arthroscopie Lavage

« NETTOYAGE ARTICULAIRE » (oil change analogy)

Arthroscopie Lavage

Candidat « idéal »

- * Symptômes mécaniques (instabilité ; blocage ..)
- * Echec du traitement médical
- * Evolution > 3 mois < 1 an
- * Faible stade RX (0 ou 1 ++)
- * Faible anomalie axiale

Arthroscopie Lavage

« Mauvais » candidat

- * Douleur sans symptôme mécanique (blocage; instabilité ; ..)
- * Pas de traitement médical
- * Fort stade RX (stade 3)
- * Anomalie axiale importante

Chirurgie du cartilage : pour préserver l'avenir

Geste de nettoyage ou de fixation

Autogreffes ostéochondrales

Greffe de cellules après mise en culture

Chirurgie cartilagineuse

Candidat « idéal »

Situation mécanique favorable

- * genou stable sans lésion méniscale
- * Bonne mobilité du genou
- * Faible stade RX (0 ou 1 ++)
- * Absence d'anomalie axiale

Chirurgie spécialisée ++ centre de référence

Ménisque : amortisseur et stabilisateur

Réparation ++++

Préservation du cartilage à long terme

Traitement conservateur des lésions méniscales +++

Chirurgie Arthroscopique des ligaments du genou ++

-Ligament Croisé Antérieur (LCA) 90%

-Ligament Croisé Postérieur (LCP) 10%

Histoire naturelle

-perte d'amortissement

-Perte de stabilité ME++

Allogreffe méniscale possible

(R Verdonk)

Mais : le ménisque aurait-il pu être conservé ???

Allogreffe Méniscale

Candidat « idéal »

- * Patient jeune 50 ans
- * Arthrose externe ++ post méniscectomie
- * Faible stade RX (0 ou 1 ++)
- * Déformation axiale modérée

Chirurgie spécialisée ++ centre de référence

Chirurgie de l'arthrose des patients jeunes : OSTEOTOMIES

Ostéotomies

Contraintes excessives et
Asymétriques +++

varus **valgus**

Ostéotomie

Objectifs

Diminuer les contraintes fémoro tibiales du compartiment usé

Moyens

Transfert de la charge sur le compartiment sain

Arthrose interne

« genou varum : origine tibiale »

Ostéotomie
tibiale de
valgisation

varus

Par soustraction externe

Par addition interne

Arthrose externe

« genou valgum : origine Fémorale »

ε

Ostéotomie
Fémorale de
varisation

Grosses déformations

Double
Ostéotomies

Ostéotomies

Candidat idéal

- * Age 40 à 60 ans; BMI 30
- * Activité importante (éviter course à pied et sauts)
- * Anomalie axiale $< 15^\circ$
- * Bonne mobilité du genou
- * Arthrose de stade 1-2 localisée à un compartiment

Ostéotomies

Facteurs péjoratifs

- * Obésité
- * Flexum fixé $> 25^\circ$
- * Arthrose évoluée et diffuse
- * Antécédents de méniscectomie du compartiment mis en charge

Patient > 55-60 ans ou stade avancé de lésions cartilagineuses & Traitement rhumatologique inefficace ou dépassé : arthroplastie de genou

3

Pincement complet sans perte osseuse

4

perte osseuse ou subluxation

Prothèse uni compartimentaire

***Chirurgie moins
invasive***

- Patient âgé ++
- Arthrose localisée
- LCA normal
- BMI normal
- Faible déformation

Exigences de l'indication

94% de survie à 10 ans

Qualité du résultat clinique

Qualité du résultat radiologique

Exigences de

l'indication

Qualité du résultat clinique

Qualité du résultat radiologique

PUC

Candidat idéal

- * Age > 65 ans; BMI < 30
- * Douleur localisée du côté usé
- * Pas de lésion ligamentaire
- * Anomalie axiale < 10° (déformation osseuse < 5°)
- * Bonne mobilité du genou
- * Arthrose sans cupule osseuse localisée à un compartiment

Prothèse Totale de genou

- Patient jeunes et plus âgé ++
- Arthrose diffuse
- lésions ligamentaires
- Forte déformation, poids ++
- ...

92 % de survie à 10 ans

Équilibrage ligamentaire dépassé : PTG contrainte

Equilibrage ligamentaire dans les prothèses totales du genou

Sous la direction de
Frédéric **DUBRANA**
Roger **BADET**
Tarik **AIT SELMI**
Philippe **NEYRET**

Illustrations : Marc **DONON**

2^{ème} édition augmentée
et corrigée

sauramps
medical

Vers une Personnalisation de la prise en charge

- Personnalisation du geste de chirurgie
- Personnalisation des activités
- Personnalisation de la prise en charge rééducative

Chirurgie assistée par ordinateur

L' informatique au service du chirurgien :
GPS du chirurgien

SFHG avril 2011

NAVIGATION CHIRURGICALE DES PTG : D'UNE PRATIQUE SYSTEMATIQUE A UNE PRATIQUE PLUS CIBLEE ?

Pôle ostéoarticulaire sport et santé

Médipole de santé
Bourgoin Jallieu

Roger BADET

Position intra médulaire des guides impossible

(déformation diaphysaires : cals vicieux ; diaphyse courbes ...)

Cal vicieux diaphysaire ?

Cal vicieux diaphysaire; matériel

Personnalisation des guides

Crèer un Positionneur de guide de spécifique du patient et de son anatomie pour mise en place d'une PTG

14 de Junho de 2012

Ouro Preto/MG

Pré evento na 5ª Jornada Lyonesa

Coordenador Científico

Prof. Dr. José Ricardo Pécora - São Paulo/SP

Convidado Internacional

Dr. Roger Badet - França

Comissão Científica

Dr. Alexandre Pagotto Pacheco - Piracicaba/SP

Dra. Ana Lúcia L. Munhoz Lima - São Paulo/SP

Dr. Edmundo Medeiros Teixeira - Goiânia/GO

Dr. Luis Eduardo P. Tírico - São Paulo/SP

Imagerie
médicale patient

Segmentation
reconstruction 3D

Réception des images
par AMPLITUDE

Reconstruction
3D de
l'anatomie du
patient

IRM ou SCANNER

Planning 3D individuel et adapté

Logiciel de planification I.M.A.G.E.V 2.0

Patient : JEAN PATRICK MADEVILL
Côté opéré : Droit
Date de chirurgie : 25/06/12

Modalité : Scanner
Type de guide : 5 en 1
Planning à délivrer pour le : 08/06/1

i.M.A.G.E.
Instrumentation genou sur mesure

TAILLE FEMUR - 7 +
ANT./POST. Post. 0 mm Ant.
FLEX./RECURV. Rec. 0° Flex.
ROTATION Int. 0° Ext.
COUPE DIST. - 6 mm +
MEDIAL Med. 3 mm Lat.
VAR./VAL. Val. 0° Var.
Réinitialiser

TAILLE TIBIA - 7 +
PENTE POSTERIEURE Ant. 1° Pos.
HAUTEUR - 6 mm +
POSTERIEUR Post. 4 mm Ant.
MEDIAL Med. 2 mm Lat.
VAR./VAL. Val. 0° Var.
ROTATION INTERNE Int. 9° Ext.
Réinitialiser

	lateral	medial
Coupe postérieure	10	10
Coupe distale	3	6

Valider le planning

Conception et fabrication des guides

Un "Rouleau" dépose des fines couches (0.1 mm) de poudre de **plastique (PA12)**

Un laser **solidifie la couche** de poudre qui **fusionne avec la précédente**

La poudre non solidifiée est retirée, le **prototype est fonctionnel**

par envoi

Livraison des guides

Conception et fabrication des guides

NON STERILE

i.M.A.G.E® Positionneurs de broches F et T avec fantômes
i.M.A.G.E® F and T pin positioning guides with phantoms

PTG – 5 en 1 / TKA – 5 in 1

Version Scanner – **Non stérile** / CT scan Version – **Non sterile**

DISPOSITIF MEDICAL SUR MESURE / CUSTOM-MADE MEDICAL DEVICE

AMPLITUDE®

REF	9-0200130
SN	0000061-P-BAL-L-RB
ID patient	P-BAL

A utiliser avant / Use by: 2012-06

Stérilisation

Vers une Personnalisation de la prise en charge

- Personnalisation du geste de chirurgie
- Personnalisation des activités
- Personnalisation de la prise en charge rééducative

Chirurgie et Sport

1. Le sport est-il possible avec une PTG?
2. Le sport est-il dangereux pour la PTG ?
3. Comment répondre aux souhaits des patients ?

La pratique du sport dépend de la motivation et du niveau sportif

TKA & HTO

Patients motivés

PTG pratiquant du sport

Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc
DOI 10.1007/s00167-009-1009-4

KNEE

Can patients really do sport after TKA?

Michel Bonnin • J. R. Laurent • S. Parratte •
F. Zadegan • R. Badet • A. Bissery

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.

Participation: PTG / UNI /OTV

Participation chez les patients motivés

Les patients âgés se contentent d'un genou non douloureux

- ✓ Conseils pour des activités physiques régulières
- ✓ Vélo, natation ,gymnastique ...
- ✓ Limitation liée à la douleur

Les jeunes patients veulent une bonne fonction même si le genou reste symptomatique

Jeunes patients : niveau d'exigence élevé

- Prévenir les exigences non adaptées
- Le sport ne doit pas être le premier objectif
- Prévoir une limitation du niveau d'activité
- Eviter les activités de pivot et de contact
- Bonne rééducation

Vers une Personnalisation de la prise en charge

- Personnalisation du geste de chirurgie
- Personnalisation des activités
- Personnalisation de la prise en charge rééducative

Contraintes médico économiques croissantes

- Diminution des durée de séjours (DMS)
- Accroissement de la chirurgie ambulatoire
- Limitation de l' accès aux centres de rééducation

- Travail synergique de réseau++ (médecin, traitant, kinés...)
- Mise en place de structures de prise en charge spécifique

Pole ostéoarticulaire santé et sport : Disciplines

- Chirurgie orthopédique
- Médecine du sport
- Médecine de rééducation
- Kinésithérapie
- Ostéopathie
- Podologie
- Préparation sportive
- Nutrition et diététique
- Sophrologie
- Psychologie du sport

Docteur
Badet

Chirurgie Orthopédique

Consultation chirurgie orthopédique

Médecine du sport / rééducation fonctionnelle

Unité de Kinésithérapie

Unité de réathlétisation

Unité de Podologie du sport

Diététique / Psychologie
sophrologie du sport

Arnaud
FRANCOIS

Thomas
PIROUD

Orthésistes

Unité d' orthèse

Salle de conférence et retransmission

Centre de rééducation fonctionnelle CSVP : 80 lits

- 50 lits d'hospitalisation
- 30 lits d'hôpital de jour
- 40% orthopédie traumatologie
- 60 % Neurologie

Ouverture depuis le 7 01 2013

MERCI